

Rimpelinspuiting met PMS

Wat is PMS?

Met het ouder worden komen de rimpeltjes, dat is onvermijdelijk. Niet iedereen is echter even gecharmeerd van deze kleine tekenen des tijds. Wanneer u uw rimpeltjes wilt verminderen, kunt u kiezen voor een behandeling met PMS. PMS is een vloeibaar product, dat na jarenlange research in Amerika is ontwikkeld voor het verbeteren van contouren en defecten bij aangeboren afwijkingen en littekens na ongevallen. De 100% zuivere siliconenenpolymeren blijken daarnaast ook uitstekend geschikt voor het corrigeren van rimpeltjes, littekentjes en lippen. De behandeling is eenvoudig en kent weinig complicaties. Als cliënt kunt u zelf bepalen wanneer u het effect voldoende vindt.

Zo werkt PMS

Bij een behandeling met PMS wordt de vloeistof met een heel fijne injectienaald in minuscule druppeltjes net onder de huid ingebracht. In reactie op deze druppeltjes maakt het lichaam bindweefsel aan. De aldus met bindweefsel omgeven PMS-druppeltjes zorgen dat de rimpeltjes, littekens of lippen worden opgevuld. Het proces van bindweefselvorming duurt enkele weken. Na ongeveer zes weken kan worden beoordeeld of er voldoende verbetering is opgetreden. De hoeveelheid bindweefsel die wordt aangemaakt is erg individueel bepaald en sommige cliënten hebben dan ook meer behandelingen nodig dan andere. Voor een goed resultaat zijn doorgaans twee tot vier behandelingen nodig. Het effect van een PMS-behandeling is blijvend, omdat het materiaal en het omringende bindweefsel niet worden afgebroken. Overigens maakt een PMS-behandeling rimpeltjes en littekentjes nooit helemaal onzichtbaar. Weliswaar wordt de huid een stuk gladder, maar de structuur kan niet worden veranderd. PMS is bij uitstek geschikt voor de correctie van fijne rimpeltjes, met name rond de mond, en voor niet al te diepe fronsrimpeltjes. Daarnaast wordt het product met succes toegepast voor het corrigeren van ondiepe littekentjes (mits niet teveel en niet al te klein) en voor lipvergroting.

De behandeling

Een behandeling met PMS vindt meestal plaats zonder lokale anesthesie. In sommige gevallen wordt de huid eerst met een huidverdovende (Emla) crème behandeld. Bij het behandelen van de lippen kan een plaatselijke verdoving door middel van kleine injecties worden gebruikt. De minuscule PMS-druppeltjes worden met een hele fijne injectienaald direct onder het huidoppervlak in het verloop van het rimpeltje/littekentje of langs de liprand(en) gespoten. De totale behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Een paar weken na de behandeling, wanneer de bindweefselreactie op gang is gekomen, wordt het effect langzaam maar zeker zichtbaar. Na zes weken kan de behandeling zo nodig worden herhaald.

Na de behandeling

De eerste paar dagen kan het behandelde gebied een beetje gezwollen zijn, maar dit verdwijnt vanzelf. Overigens is een dergelijke zwelling meer uitzondering dan regel. Bij cliënten met een tere huid kunnen gemakkelijk wat blauwe plekkjes ontstaan, maar ook die zijn na een paar dagen weer verdwenen. Een dag na de behandeling kunt u weer make-up gebruiken. De eerste paar weken raden



we u af om te zonnebaden omdat de huid dan nog wat gevoelig kan zijn. Zes weken na de behandeling komt u terug voor controle en wordt bekeken of een volgende behandeling nodig is.

Reacties van het lichaam

Allergische reacties op PMS-behandelingen zijn niet bekend en infecties komen zelden voor. Uw huid kan de eerste tijd wat overgevoelig zijn, maar dit verdwijnt weer vanzelf. Het enige echte risico van PMS is overcorrectie. Dit treedt op als er onverhoopt erg veel bindweefsel wordt gevormd. Er kunnen dan bultjes ontstaan. Om die reden worden er per behandeling altijd zeer kleine hoeveelheden PMS gebruikt en vinden vervolgbehandelingen niet eerder dan na zes weken plaats.

